

Thompson-drop-technieken

Deze techniek kenmerkt zich vooral als een zachte manipulatietechniek en maakt gebruik van de beenlengteanalyse als basisconcept.

Het komt vaak voor dat er een beenlengteverschil is als gevolg van een onbalans in het bekken .

Deze onbalans kan dan weer zijn oorzaak vinden in de neurologische onbalans van het reticulair systeem wat kan resulteren in spier-gewrichtspijn en stress op het lichaam.

Bij de Thompson techniek wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “drop-borden” waardoor een korte versnelling in de manipulatie gebracht wordt . Dankzij de plotselinge stop wordt idie bewegingsenergie omgezet in een adequate manipulatietechniek.

Na de manipulatie is men onmiddellijk in staat om te evalueren of onze techniek objectief geslaagd is.

Deze Thompson-drop-technieken worden meestal als prettig ervaren, snel en zacht.

Dag 1:

1. Optimale plaatsing v/d wervelkolom.
2. Beenlengteprocedure .
3. Cervicale syndroom
4. Klassiek cervicaal syndroom
5. Dubbel cervicaal slot
6. Atlasubluxatie
7. Overgecompenseerd cervicaal syndroom
8. Stucky friction lock
9. Anterior cervicaal
10. Posterior cervicaal
11. Bilateraal cervicaal syndroom
12. Exception Derefield

Dag2:

1. Negative derefield (D-):
 - Classic Thompson two-part adjustment
 - Modified AI sacral push adjustment

2. Positive Derfield(D+)
 - Lower foot subluxation
 - Upper foot subluxation
 - Arm fossa test
3. Lumbar spine
4. Thoracic spine
5. Clean up moves:
 - Rotated sacrum
 - Posterior rocked ischium
 - IN ilium
 - EX ilium

Dag 3 : Herhalen v/d manipulaties zodat men, op een adequate manier ,in staat is om een patiënt volledig gebalanceerd te krijgen in een zeer korte tijdspanne .